

Herzgruppen-Notfallkofferinhalt

– Empfehlung –

Stand: 11/2009

Die Gruppenärzte/Gruppenärztinnen können selbstverständlich den Inhalt des Notfallkoffers aus eigenen Beständen erweitern und ergänzen. (Empfehlenswert: 1 Amp. Morphin)

Geräte	Verfallsdatum	Anzahl	Präparatname i.v. (Wirkstoff)/Dosis	Verfallsdatum	Anzahl
Stethoskop		1	Adrenalin 1,0 mg/ml		3 Amp.
Blutdruckmessgerät		1	Amiodaron 150 mg/3 ml		2 Amp.
Ambu-Beutel		1	Aspirin (ASS) 500 mg/5ml		2 Amp.
Ambu-Beutel Masken 4,5		2	Atropin sulf. 1,0 mg/ml		5 Amp.
Güdel Tubus Größe 4,5		2	Beloc (Metoprololtatrat) 5,0 mg/5 ml		2 Amp.
Kleiderschere		1	Bricanyl (Terbutalinsulfat) 0,5 mg/ml		3 Amp.
Stauschlauch, Gummikeil		1 + 1	Diazepam 10 mg/2 ml		2 Amp.
(Blutzuckermessgerät)		1	Ebrantil (Urapidil) 25 mg/ 5 ml		2 Amp.
			Euphyllong (Theophyllin) 200 mg/10 ml		2 Amp.
			Furorese injekt (Furosemid) 40 mg/4 ml		3 Amp.
Verbrauchsmaterial			Glucose-Lösung 20 % 50 g/250 ml		1
Diagnostica			(Plastik-Infusionsflasche)		Flasche
(Glucose-Teststreifen)		10	Heparin 25.000 I.E./5 ml		2 Amp.
			Metamizol 2,5 g/5 ml		2 Amp.
Allgemein			Solu-Decortin (Prednisolon) 250 mg/5 ml		3 Amp.
puderlose Handschuhe med.		10	Tavegil (Clemastin) 2 mg/5 ml		1 Amp.
			Tramadol 100 mg/2 ml		2 Amp.
Verbandsmaterial			Vomex A (Dimenhydrinat) 62 mg/10 ml		1 Amp.
Steril-Kompressen 5 x 5 cm		5			
Steril-Kompressen 10 x 10 cm		5			
Mullbinde 6 cm x 4 m		5			
Elastomull 8 cm x 4 m		5			
Pflaster		1 Pa.			
Leukosilk 2,5 x 5 m		2			
Hansaplast Classic 1 m x 6 cm		2			
Infusionsmaterial			Sublingual		
10 ml Spritzen		10	Bayotensin akut (Nitrendipin)		2
5 ml Spritzen		10	5 mg/1 ml Phiole		Phiole
Kanülen Sterican 21 G		20			
Butterfly		5			
Infusionsbesteck		2			
Vasofix 17 G „Braunüle“		5			
Lanzetten		10			
Defibrillator			Dosieraerosol		
Elektrodengel		1	Symbicort Turbohaler 160/4,5		1
			2 Hübe		Inhalator
			Äußerlich		
			Octenisept 50 ml Flasche		1
			100 g enthalten:		Flasche
			0,1 g Octenidin, 2,0 g Phenoxyethanol		